

VI-6. 문항카드: 논술우수자 전형(자연계열)
[성신여자대학교 문항정보]

1. 일반정보

유형	논술고사	
전형명	2019학년도 논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연 계열 (수학) / <문제 1>	
출제범위	교육과정 과목명	미적분 I
	핵심개념 및 용어	도함수, $f'(x)$, 부정적분
예상소요시간	30분	

2. 문항 및 제시문

<문제 1> 다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고 이차항의 계수는 0이며, $f(0)=0$ 이다. $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = kF(x)$ 가 성립하는 0이 아닌 실수 k 가 존재한다. 다음 물음에 답하시오. [총30점]

- (1) $f(x)$ 의 차수를 구하시오. [5점]
- (2) $f(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타내시오. [15점]
- (3) $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. [10점]

3. 제시문 요약

다항함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고 이차항의 계수는 0이며, $f(0)=0$ 이다. $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = kF(x)$ 가 성립하는 0이 아닌 실수 k 가 존재할 때 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 문제이다.

4. 출제의도

미적분 I에서 다루는 다항함수의 미적분은 도함수를 구하고 이를 활용하며, 부정적분과 정적분을 구하고 이를 이용하여 도형의 넓이와 부피 등을 구하는 과정으로 되어 있다. 본 문제의 출제의도는 이러한 과정 전반을 이해하고 활용할 줄 알아야 풀 수 있도록 함으로써 미적분 전반에 관한 종합적 사고력을 측정하기 위한 것이다.

5. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	<p>[미적분]-<math>(다)</math> 다항함수의 미분법- ② 도함수 ② 함수의 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-<math>(라)</math> 다항함수의 적분법- ① 부정적분 ② 함수의 합, 차, 곱의 적분법을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-<math>(라)</math> 다항함수의 적분법- ③ 정적분의 활용 ① 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.</p>
성취기준 / 영역별 내용	<p>[미적분]-<math>(3)</math>다항함수의 미분법- (나) 도함수 미적 1321/1322 / 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-<math>(4)</math>다항함수의 적분법- (가) 부정적분 미적 1411/1412 / 부정적분의 뜻을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-<math>(4)</math>다항함수의 적분법- (다) 정적분의 활용 미적 1431 / 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.</p>

나) 자료 출처

도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수	관련자료 (교과서 등)	재구성여부
미적분	이강섭외 14인	미래엔	2014	102쪽, 150쪽, 180쪽		

※ 참고자료는 저자와 발행처, 발행연도, 쪽수를 명기하며, 교과서 자료와 교과서 외 자료로 구별하여 제시함.

6. 문항 해설


- $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = kF(x)$ 가 성립할 때 도함수와 부정적분의 차수 사이의 관계를 이용하여 $f(x)$ 의 차수를 구한다.
- 앞에서 얻은 정보를 종합하여 $f(x) = x^3 + ax$ 꼴로 두고 주어진 관계식을 이용하여 k, a 를 구한 다음 $f(x)$ 를 구한다.
- $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점을 구한 다음 그래프의 모양을 보고 주어진 도형의 넓이를 구한다.

7. 채점 기준

채점 기준	배점
<p><문제 1> (1)</p> <p>① $f(x)$의 차수를 n이라 하면 $f'(x)$의 차수는 $n-1$이므로</p> <p>② $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x)$의 차수는 $2(n-1)$이다.</p> <p>③ 그런데 $F(x)$의 차수는 $n+1$이므로</p> <p>④ $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = kF(x)$가 성립하는 0이 아닌 실수 k가 존재하려면 $2(n-1) = n+1$에서</p> <p>⑤ $n=3$이다. 즉 $f(x)$의 차수는 3이다.</p> <p>[채점 기준]</p> <p>1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음</p> <p>2등급 : ④ 단계의 방정식까지는 맞으나 답(차수)만 틀린 경우</p> <p>3등급 : ②, ③ 단계의 차수 계산은 하였으나, 방정식을 세우지 못하고, 답(차수)은 맞은 경우</p> <p>4등급 : ②, ③ 단계의 차수 계산은 하였으나, 방정식을 세우지 못하고, 답(차수)도 틀린 경우</p> <p>5등급 : ② 단계 또는 ③ 단계의 차수 중 하나만 구하고 다른 답을 구하지 못한 경우</p> <p>6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우</p>	5
<p><문제 1> (2)</p> <p>① $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고 이차항의 계수는 0이며, $f(0) = 0$이므로 $f(x) = x^3 + ax$로 두자.</p> <p>② 이때 $f'(x) = 3x^2 + a$이므로</p> <p>③ $kF(x) = \{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = (3x^2 + a)^2 - 8(3x^2 + a)$ $= 9x^4 + 6(a-4)x^2 + a^2 - 8a$ 이다.</p> <p>④ 따라서 $kf(x) = (kF(x))' = 36x^3 + 12(a-4)x$이므로 $k = 36$이고, $36a = 12(a-4)$에서 $a = -2$이다.</p> <p>⑤ 그러므로 $f(x) = x^3 - 2x$이다.</p> <p>[채점 기준]</p> <p>1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음</p> <p>2등급 : ④ 단계의 관계식까지는 맞으나 k 또는 a의 값이 틀린 경우</p> <p>3등급 : ②, ③ 단계의 식이 다 맞으나 ④ 단계의 $kf(x)$를 구하지 못한 경우</p> <p>4등급 : ②, ③ 단계의 식 중 하나만 맞고 하나는 틀린 경우</p> <p>5등급 : ① 단계 $f(x)$의 식을 구하고, 그 과정을 설명한 경우</p> <p>6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우</p>	15

<문제 1> (3)

- ① $f(x) = x^3 - 2x = x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ 이므로
 ② 그래프는 다음 그림과 같다.



- ③ $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |x^3 - 2x| dx$$

④ $= 2 \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3) dx$

⑤ $= 2 \left[x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2$

[채점 기준]

1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음

※ 그래프가 그려져 있지 않아도 그래프에 대한 설명이 있고 그 설명이 옳으며,
 풀이 과정이 맞으면 인정하며, ④ 단계의 식은 다음과 같아도 됨

$$\int_{-\sqrt{2}}^0 (x^3 - 2x) dx + \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3) dx$$

2등급 : ④ 단계의 절댓값을 푼 과정까지는 맞으나 답만 틀린 경우

3등급 : ③ 단계의 계산식은 있으나, 계산을 하지 못하고, 답이 틀린 경우

4등급 : ② 단계의 그래프를 그리거나 그래프를 설명하였으나, ③ 단계의 계산식을 구하지 못해
 답도 틀린 경우

5등급 : ① 단계까지만 하고 다른 단계로 가지 못한 경우

6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

8. 예시답안

<문제 1>

(1) $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하면 $f'(x)$ 의 차수는 $n-1$ 이므로 $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x)$ 의 차수는 $2(n-1)$ 이다. 그런데 $F(x)$ 의 차수는 $n+1$ 이므로 $\{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = kF(x)$ 가 성립하는 0이 아닌 실수 k 가 존재하려면 $2(n-1) = n+1$ 에서 $n=3$ 이다. 즉 $f(x)$ 의 차수는 3이다.

(2) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고 이차항의 계수는 0이며, $f(0) = 0$ 이므로 $f(x) = x^3 + ax$ 로 두자. 이때 $f'(x) = 3x^2 + a$ 이므로

$$kF(x) = \{f'(x)\}^2 - 8f'(x) = (3x^2 + a)^2 - 8(3x^2 + a) = 9x^4 + 6(a-4)x^2 + a^2 - 8a$$

이다.

따라서 $kf(x) = (kF(x))' = 36x^3 + 12(a-4)x$ 이므로 $k=36$ 이고, $36a = 12(a-4)$ 에서 $a = -2$ 이다.

그러므로 $f(x) = x^3 - 2x$ 이다.

(3) $f(x) = x^3 - 2x = x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ 이므로 그래프는 x 축과 세 점 $(-\sqrt{2}, 0), (0, 0), (\sqrt{2}, 0)$ 에서 만난다.

$-\sqrt{2} \leq x \leq 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이고 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} |x^3 - 2x| dx = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3) dx = 2 \left[x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2 \text{ 이다.}$$


[성신여자대학교 문항정보]

1. 일반정보

유형	논술고사	
전형명	2019학년도 논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연 계열 (수학) / <문제 2>	
출제범위	교육과정 과목명	미적분Ⅱ
	핵심개념 및 용어	호도법, 부채꼴의 넓이, 삼각함수, 극한
예상소요시간	25분	

2. 문항 및 제시문

<문제 2> 좌표평면에서 $O(0,0)$ 이고 $A(1,0)$ 이다. 중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 위에서 움직이는 점 P 에 대하여 $\angle POA = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)라고 하자. 이때 원점 O 를 중심으로 점 P 를 2θ 만큼 회전시킨 점을 Q 라 하고, 점 P 와 Q 에서 각각 원에 그은 접선의 교점을 R 라고 하자. 다음 물음에 답하시오. [총25점]



(1) 선분 OR 의 길이와 점 R 의 x 좌표를 구하시오. [10점]

(2) 사각형 $OPRQ$ 의 넓이를 $f(\theta)$ 라고 할 때, $f(\theta)$ 를 θ 에 대한 식으로 나타내시오. [5점]

(3) 부채꼴 POA 의 넓이를 $g(\theta)$ 라고 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{g(\theta)}$ 를 구하시오. [10점]

3. 제시문 요약

좌표평면에서 $O(0,0)$ 이고 $A(1,0)$ 이다. 중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 위에서 움직이는 점 P 에 대하여 $\angle POA = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)라고 하자. 이때 원점을 중심으로 점 P 를 2θ 만큼 회전시킨 점을 Q 라 하고, 점 P 와 Q 에서 각각 원에 그은 접선의 교점을 R 라고 하자. 이와 같이 주어

진 상황에서 선분 OR의 길이와 점 R의 x 좌표를 구하고, 사각형 OPRQ의 넓이 $f(\theta)$ 를 θ 에 대한 식으로 나타낸 후, 부채꼴 POA의 넓이를 $g(\theta)$ 라고 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{g(\theta)}$ 를 구하는 문제이다.

4. 출제의도

미적분Ⅱ에서 다루는 호도법과 부채꼴의 넓이에 대한 이해를 바탕으로 삼각함수를 활용하여 도형의 넓이 문제를 정확히 분석하고 논리적 과정을 통하여 해결할 수 있는 지 평가하고자 한다. 또한 삼각함수의 극한에 대한 이해와 적용을 스스로 전개해 나가며 그에 대한 설명을 논리적으로 서술할 수 있는 지도 평가하고자 한다.

5. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	[미적분Ⅱ]-(4) 삼각함수-① 삼각함수의 뜻과 그래프 ① 일반각과 호도법의 뜻을 안다. ② 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [미적분Ⅱ]-(4) 삼각함수-② 삼각함수의 미분 ② 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.
성취기준 / 영역별 내용	미적2211-2. 호도법의 뜻을 알고, 각을 호도법과 60분법으로 나타낼 수 있다. 미적 12-1. 삼각함수의 뜻을 알고, 간단한 삼각함수의 값을 구할 수 있다. 미적2222. 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.


나) 자료 출처

도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수	관련자료 (교과서 등)	재구성여부
미적분Ⅱ	이강섭외 14인	미래엔	2014	51, 53, 57, 87		

※ 참고자료는 저자와 발행처, 발행연도, 쪽수를 명기하며, 교과서 자료와 교과서 외 자료로 구별하여 제시함.

6. 문항 해설

- (1) 원 위의 한 점에서의 접선이 그 점까지의 반지름에 수직이라는 성질에 의하여 $\overline{OP} \perp \overline{PR}$ 임을 서술하고 $\triangle OPR$ 은 직각삼각형을 밝힌다. 이로부터 삼각함수의 뜻을 적용하여 $\cos\theta = \frac{1}{\overline{OR}}$ 임을 설명하고, $\overline{OR} = \sec\theta$ 임을 보인다.
그리고 $\angle ROA = 2\theta$ 임을 확인한다.
이 두 가지 사실로부터 점 R의 x 좌표가 $\sec\theta \cos 2\theta$ 임을 보인다.



- (2) 사각형 OPRQ의 넓이 $f(\theta)$ 는 합동인 두 직각삼각형의 넓이의 합임을 이해하고, 직각삼각형 $\triangle OPR$ 에서 변 OP의 길이는 1이고, 변 PR의 길이는 $\tan\theta$ 임을 보여

$$f(\theta) = 2\left(\frac{1}{2}\overline{OP} \times \overline{PR}\right) = \overline{PR} = \tan\theta \text{ 임을 설명한다.}$$

- (3) 부채꼴 POA의 넓이는 호도법으로 나타낸 중심각 θ 에 대하여 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 임을 이해하여

$$g(\theta) = \frac{1}{2} \times 1^2 \times \theta = \frac{\theta}{2} \text{ 를 구하고, 앞에서 구한 } f(\theta) \text{ 를 적용하여 주어진 극한을 구한다.}$$

$$\text{이때 } \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \text{ 임을 이용하여}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\tan\theta}{\frac{\theta}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin\theta}{\theta} \cdot \frac{2}{\cos\theta} \right) = \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin\theta}{\theta} \right) \cdot \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2}{\cos\theta} \right) = 2$$

임을 보인다.

7. 채점 기준

채점 기준	배점
<p><문제 2> (1)</p> <p>① 원의 접선의 성질에 의하여 $\overline{OP} \perp \overline{PR}$ 이므로 $\triangle OPR$은 직각삼각형이다.</p> <p>② 따라서 $\cos\theta = \frac{1}{\overline{OR}}$</p> <p>③ 즉 $\overline{OR} = \sec\theta$ 이다.</p> <p>④ 그리고 $\angle ROA = 2\theta$ 이므로</p> <p>⑤ 점 R의 x좌표는 $\sec\theta \cos 2\theta$이다.</p>	10

[채점 기준]

- 1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음
- 2등급 : ④ 단계를 서술했으나 그 이후 ⑤ 단계에서 오류가 있는 경우
- 3등급 : ③ 단계를 시도했으나 오류가 있는 경우
- 4등급 : ② 단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 5등급 : ① 단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

<문제 2> (2)

- ① 직각삼각형 $\triangle OPR$ 에서 변 OP 의 길이는 1이고,
- ② 변 PR 의 길이는 $\tan\theta$ 이므로
- ③ $f(\theta) = 2\left(\frac{1}{2}\overline{OP} \times \overline{PR}\right) = \overline{PR} = \tan\theta$ 이다.

[채점 기준]

- 1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음
- 2등급 : ③ 단계를 서술했으나 오류가 있는 경우
- 3등급 : ② 단계까지는 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 4등급 : ② 단계를 서술했으나 오류가 있는 경우
- 5등급 : ① 단계까지는 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

5

<문제 2> (3)

- ① 부채꼴 POA 의 넓이는 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 이므로
- ② $g(\theta) = \frac{1}{2} \times 1^2 \times \theta = \frac{\theta}{2}$ 이다.
- ③ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\tan\theta}{\frac{\theta}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin\theta}{\theta} \cdot \frac{2}{\cos\theta} \right)$ 이다.
- ④ 그리고 $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ 이므로
- ⑤ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin\theta}{\theta} \right) \cdot \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2}{\cos\theta} \right) = 2$ 이다.

[채점 기준]

- 1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음
- 2등급 : ④ 단계를 서술했으나 그 이후 ⑤ 단계에서 오류가 있는 경우
- 3등급 : ③ 단계를 시도했으나 오류가 있는 경우
- 4등급 : ② 단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 5등급 : ① 단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

10


[성신여자대학교 문항정보]

1. 일반정보

유형	논술고사	
전형명	2019학년도 논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연 계열 (수학) / <문제 3>	
출제범위	교육과정 과목명	기하와 벡터, 미적분I, 미적분II
	핵심개념 및 용어	평면 운동, 삼각함수
예상소요시간	30분	

2. 문항 및 제시문

<문제 3> 아래 그림과 같이 지면을 x 축, 지면에 수직인 방향을 y 축으로 하는 좌표평면을 설정하고, 시각 $t=0$ 일 때 원점 O 로부터 발사된 공의 위치를 점 $P(x, y)$ 로 나타내었다. 공을 원점 O 에서 속력 v_0 로 x 축의 양의 방향과 예각 θ 를 이루는 방향으로 발사했다고 하면 시각 t 일 때 공의 속도는 $\vec{v} = (v_0 \cos \theta, -10t + v_0 \sin \theta)$ 로 주어진다. 공이 x 축으로부터 높이 36인 한 지점을 지날 때 관측된 속도가 $\vec{v} = (15, 24)$ 라고 한다. 다음 물음에 답하시오. [총30점]



- (1) 점 P 의 y 좌표의 최댓값을 구하시오. [10점]
- (2) 원점 O 에서 발사된 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구하시오. [10점]
- (3) 이번에는 공을 원점 O 에서 속력 v_0 로 x 축의 양의 방향과 예각 $\frac{\theta}{2}$ 를 이루는 방향으로 발사했다. 이때 발사된 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구하시오. [10점]

3. 제시문 요약

좌표평면에서 원점 O로부터 속도 v_0 로 x 축의 양의 방향과 예각 θ 를 이루는 방향으로 발사된 공의 속도가 $\vec{v} = (v_0 \cos \theta, -10t + v_0 \sin \theta)$ 으로 주어졌다. 높이 36인 한 지점에서 공의 속도가 $\vec{v} = (15, 24)$ 으로 측정되었을 때, 공의 y 좌표의 최댓값과 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구한다. 그리고 원점 O에서 동일한 속도 v_0 로 x 축의 양의 방향과 예각 $\frac{\theta}{2}$ 로 바꾸어 발사했을 때 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구한다.

4. 출제의도

기하와 벡터에서 다루는 평면좌표계에서의 운동에 대한 개념과 미적분 I에서 다루는 정적분 개념을 응용하여 포물선 운동을 하는 물체가 다다를 수 있는 최대 높이와 수평 방향으로 이동한 거리를 구한다. 그리고 미적분 II에서 다루는 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 다른 각도로 발사된 물체가 수평 방향으로 이동한 거리를 구한다. 본 문제는 이러한 과정 전반을 이해하고 활용할 줄 알아야 풀 수 있도록 함으로써 종합적 사고능력을 측정하기 위하여 출제 되었다.

5. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	<p>[기하와 벡터] (ㄴ) 평면벡터 - ㉓ 평면 운동 (101쪽) ③ 정적분을 이용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.</p> <p>[미적분 I] (㉞) 다항함수의 적분법 - ㉓ 정적분의 활용 (83쪽) ② 정적분을 활용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.</p> <p>[미적분 III] (ㄴ) 삼각함수 - ㉓ 삼각함수의 미분 (91쪽) ① 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.</p>
성취기준 / 영역별 내용	<p>[기하와 벡터] (2) 평면벡터 - (ㄴ) 평면운동 (278쪽) 기백1232. 정적분을 이용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.</p> <p>[미적분 I] (4) 다항함수의 적분법 - (ㄴ) 정적분의 활용 (189쪽) 미적1432. 정적분을 활용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.</p> <p>[미적분 III] (2) 삼각함수 - (ㄴ) 삼각함수의 미분 (230쪽) 미적2221-2. 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.</p>

나) 자료 출처

도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수	관련자료 (교과서 등)	재구성여부
기하와 벡터	우정호외 24인	동아출판	2014	137쪽	교과서 자료	
기하와 벡터	이강섭외 14인	미래엔	2014	116쪽	교과서 자료	
미적분 I	우정호외 24인	동아출판	2014	142쪽, 226쪽	교과서 자료	
미적분 II	우정호외 24인	동아출판	2014	103쪽	교과서 자료	
미적분 II	이강섭외 14인	미래엔	2014	83쪽	교과서 자료	
미적분 II	김원경외 11인	비상교육	2014	79쪽	교과서 자료	

6. 문항 해설

(1) 좌표평면에서 공의 속도가 $\vec{v} = (v_0 \cos \theta, -10t + v_0 \sin \theta)$ 로 주어지고, 높이가 36일 때 관측된 속도가 $\vec{v} = (15, 24)$ 라는 것을 이용하여 공의 y 좌표의 최댓값을 구한다.

(2) 원점에서 공의 초기속도와 공이 최고높이에 도달한 시간을 이용하여 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구한다.

(3) 이번에는 공을 원점 O 에서 속력 v_0 로 x 축의 양의 방향과 예각 $\frac{\theta}{2}$ 를 이루는 방향으로 발사 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표를 구한다.

7. 채점 기준

채점 기준	배점
<p><문제 3> (1)</p> <p>① 초기위치 $(x_0, y_0) = (0, 0)$에서 발사된 공의 시각 t일 때의 위치가 $P(x, y)$이고 속도가 $\vec{v} = (v_x(t), v_y(t)) = (v_0 \cos \theta, -10t + v_0 \sin \theta)$이므로, $x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(t)dt = (v_0 \cos \theta)t$, $y(t) = y_0 + \int_0^t v_y(t)dt = -5t^2 + (v_0 \sin \theta)t$ 이다.</p>	

- ② 높이 36인 위치를 지날 때 $t = a$ 라고 하면 $-5a^2 + (v_0 \sin \theta)a = 36$ 이고, 이때 공의 y 방향 속도로부터 $-10a + v_0 \sin \theta = 24$ 이다.
- ③ 이 두 식으로부터 $5a^2 + 24a - 36 = (5a - 6)(a + 6) = 0$
즉 $a = \frac{6}{5} (> 0)$ 이고, $v_0 \sin \theta = 36$ 임을 얻는다.
- ④ 한편, 공이 최대 높이에 도달했을 때 $t = b$ 라고 하면, 이때 공의 y 방향 속도가 0이므로
 $0 = -10b + v_0 \sin \theta = -10b + 36$, 즉 $b = \frac{18}{5}$ 이다.
- ⑤ 따라서 공이 도달하는 최대 높이는 $-5b^2 + (v_0 \sin \theta)b = \frac{324}{5} = 64.8$ 이다.

[채점 기준]

- 1등급 : ⑤ 단계까지 일부 생략이 있으나 오류가 없이 공이 도달하는 최대 높이를 정확히 구한 경우
- 2등급 : ④ 단계까지 일부 생략이 있으나 오류가 없이 공이 최대 높이에 도달한 시간 $\frac{18}{5}$ 과 공의 초기 속도 $v_0 \sin \theta = 36$ 까지 모두 구한 경우
- 3등급 : 일부 생략이 있으나 ④ 단계 공이 최대 높이에 도달한 시간 $\frac{18}{5}$ 과 공의 초기 속도 $v_0 \sin \theta = 36$ 중 한 가지만 구한 경우
- 4등급 : 일부 생략이 있으나 ③ 단계 공의 속도가 측정된 $\frac{6}{5}$ 까지 구한 경우
- 5등급 : ① 단계 시작 t 일 때 공의 위치에 대한 식까지 구한 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

10

<문제 3> (2)

- ① 공의 x 방향 속도는 일정하므로 $v_x(t) = v_0 \cos \theta = 15$ 이다.
- ② 공이 다시 지면에 닿을 때 시각을 $t = c$ ($c > 0$)라고 하면
 $-5c^2 + (v_0 \sin \theta)c = c(-5c + 36) = 0$ 이므로 $c = \frac{36}{5}$ 이다.
- ③ 따라서 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표는
 $(v_0 \cos \theta)c = 15 \times \frac{36}{5} = 108$ 이다.

[채점 기준]

- 1등급 : ③ 단계까지 일부 생략이 있으나 오류가 없이 공이 다시 지면에 닿는 지점의 좌표 $x = 108$ 을 정확히 구한 경우
- 2등급 : ③ 단계까지의 풀이과정을 모두 기술했으나 계산 오류로 최종 답이 틀린 경우.
② 단계에서 공이 다시 지면에 닿을 때의 시간을 구하는 식을 올바르게 썼으나 시간 $\frac{36}{5}$ 을 정확히 구하지 못하여 최종 결과가 틀린 경우도 포함.

10

- 3등급 : ① 단계 풀이과정의 유무와는 상관없이 ② 단계 공이 다시 지면에 닿을 때의 시간 $\frac{36}{5}$ 까지만 정확히 구하였으나 ③ 단계 풀이과정에 대한 기술도 없는 경우
- 4등급 : ① 단계 풀이과정의 유무와는 상관없이 ② 단계 공이 다시 지면에 닿을 때의 시간을 구하는 식을 썼으나 시간 $\frac{36}{5}$ 을 정확히 구하지 못하였고 ③ 단계 풀이과정에 대한 기술도 없는 경우
- 5등급 : ① 단계 공의 x 방향 속도는 일정하다는 것만 언급된 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

<문제 3> (3)

- ① x 축의 양의 방향과 예각 $\frac{\theta}{2}$ 를 이루는 방향으로 발사된 공의
 시각 t 일 때의 속도는 $(v_0 \cos \frac{\theta}{2}, -10t + v_0 \sin \frac{\theta}{2})$ 가 되며,
 위치는 $((v_0 \cos \frac{\theta}{2})t, -5t^2 + (v_0 \sin \frac{\theta}{2})t)$ 가 된다.
- ② 발사된 공이 지면에 다시 닿을 때 시각 $t = d$ 라고 하면
 $0 = -5d^2 + (v_0 \sin \frac{\theta}{2})d$ 로부터 $d = \frac{v_0}{5} \sin \frac{\theta}{2}$ 이다.
- ③ 공의 x 방향 속도는 $v_0 \cos \frac{\theta}{2}$ 으로 일정하므로
 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표는
 $(v_0 \cos \frac{\theta}{2})d = (v_0 \cos \frac{\theta}{2}) \left(\frac{v_0}{5} \sin \frac{\theta}{2} \right) = \frac{(v_0)^2}{5} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \frac{v_0}{10} (v_0 \sin \theta)$ 이다.
- ④ 앞에서 $v_0 \sin \theta = 36$ 과 $v_0 \cos \theta = 15$ 이었고,
 $v_0 = \sqrt{(v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta)^2} = \sqrt{15^2 + 36^2} = 39$ 이므로
 지면에 닿는 지점의 x 좌표는 $\frac{39}{10} \times 36 = \frac{702}{5} = 140.4$ 이다.

[채점 기준]

- 1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞는 경우
- 2등급 : ④ 단계까지의 풀이 과정이 맞으나 v_0 를 정확히 계산해 내지 못하거나 기타 계산 오류로 최종 답이 틀린 경우.
- 3등급 : ③ 단계 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표에 대한 식
 $\frac{(v_0)^2}{5} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ 또는 $\frac{v_0}{10} (v_0 \sin \theta)$ 를 얻은 경우
- 4등급 : ② 단계 공이 다시 지면에 닿았을 때의 시간에 대한 식 $\frac{v_0}{5} \sin \frac{\theta}{2}$ 를 얻은 경우
- 5등급 : ① 단계 공의 위치에 대한 식을 정확히 얻은 경우
- 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

8. 예시답안

〈문제 3〉

(1) 초기위치 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 에서 발사된 공의 시각 t 일 때의 위치가 $P(x, y)$ 이고 속도가

$$\vec{v} = (v_x(t), v_y(t)) = (v_0 \cos \theta, -10t + v_0 \sin \theta) \text{이므로, } x = x_0 + \int_0^t v_x(t) dt = (v_0 \cos \theta)t,$$

$$y = y_0 + \int_0^t v_y(t) dt = -5t^2 + (v_0 \sin \theta)t \text{이다. 따라서 높이 36인 위치를 지날 때 } t = a \text{라고 하면}$$

먼저 $-5a^2 + (v_0 \sin \theta)a = 36$ 이고, 또 이때 공의 y 방향 속도로부터 $-10a + v_0 \sin \theta = 24$ 이다.

이 두 식으로부터 $5a^2 + 24a - 36 = (5a - 6)(a + 6) = 0$, 즉 $a = \frac{6}{5} (> 0)$ 이고, $v_0 \sin \theta = 36$ 임을 얻는다. 한편, 공이 최대 높이에 도달했을 때 $t = b$ 라고 하면, 이때 공의 y 방향 속도가 0이므로 $0 = -10b + v_0 \sin \theta = -10b + 36$, 즉 $b = \frac{18}{5}$ 이다. 따라서 공이 도달하는 최대 높이는

$$-5b^2 + (v_0 \sin \theta)b = \frac{324}{5} = 64.8 \text{이다.}$$

(2) 공의 x 방향 속도는 일정하므로 $v_x(t) = v_0 \cos \theta = 15$ 이다. 공이 다시 지면에 닿을 때 시각을

$$t = c \quad (c > 0) \text{라고 하면 } -5c^2 + (v_0 \sin \theta)c = c(-5c + 36) = 0 \text{이므로 } c = \frac{36}{5} \text{이다. 따라서 공이}$$

$$\text{다시 지면에 닿는 지점의 } x \text{좌표는 } (v_0 \cos \theta)c = 15 \times \frac{36}{5} = 108 \text{이다.}$$

(3) 지면과 예각 $\frac{\theta}{2}$ 를 이루는 방향으로 발사된 공의 시각 t 일 때의 속도는

$$\left(v_0 \cos \frac{\theta}{2}, -10t + v_0 \sin \frac{\theta}{2} \right) \text{가 되며, 위치는 } \left(\left(v_0 \cos \frac{\theta}{2} \right)t, -5t^2 + \left(v_0 \sin \frac{\theta}{2} \right)t \right) \text{가 된다. 발사된}$$

$$\text{공이 지면에 다시 닿을 때 } t = d \text{라고 하면 } 0 = -5d^2 + \left(v_0 \sin \frac{\theta}{2} \right)d \text{로부터 } d = \frac{v_0}{5} \sin \frac{\theta}{2} \text{이다.}$$

공의 x 방향 속도는 $v_0 \cos \frac{\theta}{2}$ 으로 일정하므로 공이 다시 지면에 닿는 지점의 x 좌표는

$$\left(v_0 \sin \frac{\theta}{2} \right)d = \left(v_0 \sin \frac{\theta}{2} \right) \left(\frac{v_0}{5} \cos \frac{\theta}{2} \right) = \frac{v_0}{10} (v_0 \sin \theta) \text{이다. 앞에서 } v_0 \sin \theta = 36 \text{과}$$

$$v_0 \cos \theta = 15 \text{이었고, } v_0 = \sqrt{(v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta)^2} = \sqrt{15^2 + 36^2} = 39 \text{이므로 지면에 닿는}$$

$$\text{지점의 } x \text{좌표는 } \frac{39}{10} \times 36 = \frac{702}{5} = 140.4 \text{이다.}$$

[성신여자대학교 문항정보]

1. 일반정보

유형	논술고사	
전형명	2019학년도 논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연 계열 (수학) / <문제 4>	
출제범위	교육과정 과목명	확률과 통계, 미적분I
	핵심개념 및 용어	중복조합, 급수, 급수의 합
예상소요시간	15분	

2. 문항 및 제시문

<문제 4> 자연수 n 에 대하여 $p \times q \times r = 5^n$ 을 만족시키는 1 보다 큰 자연수 p, q, r 의 순서쌍 (p, q, r) 의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, $a_1 = 0$ 이다. 다음 물음에 답하시오. [총15점]

(1) $a_n \neq 0$ 인 자연수 n 의 최솟값을 k 라 할 때, k 의 값을 구하시오. [5점]

(2) $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 구하시오. [10점]

3. 제시문 요약

자연수 n 에 대하여 $p \times q \times r = 5^n$ 을 만족시키는 1 보다 큰 자연수 p, q, r 의 순서쌍 (p, q, r) 의 개수를 a_n 이라 할 때 $a_n \neq 0$ 인 최소의 자연수 n 의 값과, 급수 $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 구하는 문제이다.

4. 출제의도

확률과 통계에서 다루는 중복조합의 수를 구하고, 이를 이용하여 급수의 합을 계산하도록 함으로써 확률과 통계 교과 및 미적분I의 학습 내용에 관한 종합적 이해와 사고력을 측정하기 위한 것이다.

5. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	<p>[미적분]-⑦ 수열의 극한-① 수열의 극한 ② 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-⑦ 수열의 극한-② 급수 ① 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.</p> <p>[확률과 통계] (가) 순열과 조합-② 순열과 조합 ④ 중복조합을 이해하고, 그 조합의 수를 구할 수 있다.</p>
성취기준 / 영역별 내용	<p>[미적분]-(1) 수열의 극한 (가) 수열의 극한 미적1112. 수열의 극한에 관한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.</p> <p>[미적분]-(1) 수열의 극한 (나) 급수 미적 1121. 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고 이를 판별할 수 있다.</p> <p>[확률과 통계] (1) 순열과 조합 - (나) 순열과 조합 미적1122. 조합의 뜻을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다.</p>

나) 자료 출처

도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수	관련자료 (교과서 등)	재구성여부
미적분 1	이강섭외 14인	미래엔	2014	32쪽		
확률과 통계	김원경 외 11인	비상	2014	35쪽		

※ 참고자료는 저자와 발행처, 발행연도, 쪽수를 명기하며, 교과서 자료와 교과서 외 자료로 구별하여 제시함.

6. 문항 해설

(1) $p \times q \times r = 5^n$ 을 만족시키는 1 보다 큰 자연수 p, q, r 의 순서쌍 (p, q, r) 는 $n < 3$ 인 경우에는 나타나지 않음을 이해하여 n 의 최솟값을 구한다.

(2) 중복조합의 수를 구하는 방법으로 a_n 을 구하고, $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 계산한다.

7. 채점 기준

채점 기준	배점
<p><문제 4> (1)</p> <p>① $p \times q \times r = 5^n$이고 p, q, r은 2 이상의 정수이므로 $p = 5^x, q = 5^y, r = 5^z$인 자연수 x, y, z가 존재한다.</p> <p>② 따라서 $5^{x+y+z} = 5^n$이고 $x+y+z = n$이므로 $n \geq 3$이다.</p> <p>③ 그런데 $n = 3$이면 $5^1 \times 5^1 \times 5^1 = 5^3$과 같이 조건을 만족하는 (p, q, r)이 있으므로 $a_3 \neq 0$이다.</p> <p>④ 즉 $a_n \neq 0$인 자연수 n의 최솟값은 3이므로 $k = 3$이다.</p> <p>[채점 기준]</p> <p>1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 ※ ②, ③ 단계는 다음과 같은 풀이도 가능한 정답임 $n = 1$일 때 $5^{x+y+z} = 5^1$을 만족하는 자연수 x, y, z는 존재하지 않는다. $n = 2$일 때 $5^{x+y+z} = 5^2$을 만족하는 자연수 x, y, z는 존재하지 않는다. $n = 3$일 때 $5^{x+y+z} = 5^3$을 만족하는 자연수 x, y, z는 $x = y = z = 1$이 존재한다. 따라서 $a_3 \neq 0$이다.</p> <p>2등급 : ③ 단계의 $a_3 \neq 0$까지는 계산했으나, 그것이 최솟값임을 설명하지 않은 경우 3등급 : ② 단계의 $x+y+z = n$까지 계산했으나, $n \geq 3$임을 설명하지 못한 경우 4등급 : ② 단계의 $5^{x+y+z} = 5^n$까지 계산했으나, 다음 단계 $x+y+z = n$으로 나가지 못한 경우 5등급 : ① 단계까지만 하고 다른 단계로 가지 못한 경우 6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우</p>	5
<p><문제 4> (2)</p> <p>① 조건을 만족하는 (p, q, r)의 개수는 방정식 $x+y+z = n$을 만족하는 자연수 해 (x, y, z)의 개수와 같다.</p> <p>② 이것은 x, y, z를 적어도 각각 하나씩 택하고 나머지 $n-3$개는 x, y, z에서 중복 허용하여 택하는 조합의 수와 같으므로</p> <p>③ $a_n = {}_3H_{n-3} = {}_{n-1}C_{n-3} = {}_{n-1}C_2 = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$이다.</p> <p>④ $k = 3$이므로 $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{(n-1)(n-2)}$</p> <p>⑤ $= 2 \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right)$ $= 2 \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \right\} = 2$</p>	10

[채점 기준]

1등급 : 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음

2등급 : ④ 단계의 $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{(n-1)(n-2)}$ 까지는 나타냈으나 계산을 완료하여 답을 구하지 못했거나 답이 틀린 경우

3등급 : ③ 단계의 $a_n = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 까지는 구했으나, $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{(n-1)(n-2)}$ 로 나타내지 못한 경우

4등급 : ② 단계의 $a_n = {}_3H_{n-3}$ 이 있거나 설명이 완벽하게 되어 있으나, 그 다음 a_n 의 식을 구하는 단계로 가지 못한 경우

5등급 : ① 단계까지만 하고 다른 단계로 가지 못한 경우

6등급 : 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

8. 예시답안

<문제 4>

(1) $p \times q \times r = 5^n$ 이고 p, q, r 은 2 이상의 정수이므로 $p = 5^x, q = 5^y, r = 5^z$ 인 자연수 x, y, z 가 존재한다. 따라서 $5^{x+y+z} = 5^n$ 이고 $x+y+z = n$ 이므로 $n \geq 3$ 일 때 $a_n \neq 0$ 이다. 즉 $a_n \neq 0$ 인 자연수 n 의 최솟값은 3이므로 $k = 3$ 이다.

(2) 조건을 만족하는 (p, q, r) 의 개수는 $x+y+z = n$ 을 만족하는 자연수의 개수와 같으므로

$$a_n = {}_3H_{n-3} = {}_{n-1}C_{n-3} = {}_{n-1}C_2 = \frac{(n-1)(n-2)}{2} \text{이다. 따라서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n} &= \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{(n-1)(n-2)} = 2 \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} 2 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \right\} = 2 \text{이다.} \end{aligned}$$